

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «СмартХим»

А.В. Мазура

«08» сентября 2016 г.



## Инструкция по применению

### Средство моющее «Ultramil» марки Foam

#### Назначение.

Средство моющее «Ultramil» марки Foam – готовое к применению средство на основе хлоргексидина биглюконата, мягких ПАВ, эмульгентов и глицерина, предназначенное для обработки вымени перед доением с целью удаления загрязнений с поверхности кожи, основания вымени и сосков, контактирующих в дальнейшем, в процессе доения коров, с сосковой резиной. Рекомендуется для регулярной санитарной обработки сосков вымени перед надеванием на них стаканов доильного аппарата. Концентрация хлоргексидина биглюконата – 2500 ppm.

**По органолептическим и физико-химическим показателям средство должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.**

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика и норма
1 Внешний вид, цвет	Однородная однофазная жидкость цвета применяемых красителей
2 Запах	Применяемых компонентов
3 Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,050±0,050
4 Показатель концентрации водородных ионов раствора с массовой долей средства 1%, ед. рН	7,0 ± 1,5
Примечания: 1 Допускается в процессе хранения появление небольшого осадка. 2 Образование осадка или помутнение при хранении не является браковочным фактором.	

**Гарантийный срок хранения** - 18 месяцев в невскрытой упаковке производителя.

#### Условия хранения:

транспортировка и хранение согласно ГОСТ 27429 и ГОСТ 28303.

Хранить в крытых вентилируемых помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия солнечных лучей и отопительных приборов, в упаковке изготовителя при температуре не ниже 0<sup>0</sup>С и не выше 25<sup>0</sup>С. Не допускать замерзания средства.

#### Меры предосторожности:

Беречь от детей. При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности. Для защиты кожи рук могут применяться резиновые перчатки.

При попадании средства в глаза их необходимо промыть большим количеством воды. При попадании средства внутрь через пищевой тракт дать выпить пострадавшему несколько

стаканов воды. Рвоту не вызывать! Принять 10-20 измельченных таблеток активированного угля. При раздражении органов дыхания (першение в горле, кашель, затрудненное дыхание), рези в глазах пострадавшего удаляют из помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой, дают теплое питье. При необходимости следует обратиться к врачу.

#### **Способы применения:**

Средство поставляется в готовом к применению виде. Средство может использоваться в виде спрея для очистки вымени, в виде раствора для замачивания салфеток, а также для пенной обработки вымени с помощью пенообразующего стаканчика.

1. Использование в виде спрея: средство разбрызгивается на соски, затем протирается мягкой салфеткой. Одно вымя вытирается одной салфеткой.
2. Вымя обрабатывается специальной салфеткой, смоченной в средстве.
3. С помощью специального пенообразующего стаканчика получают активную густую пену, в которой соски могут быть вымыты путем погружения в пену на короткое время (10-15 секунд). После обработки вымя вытирается насухо мягкой салфеткой. Одно вымя вытирается одной салфеткой.

#### **Преимущества:**

- готовая к применению форма;
- обладает прекрасным очищающим действием;
- увлажняет, смягчает и обеззараживает кожу вымени;
- снижает риск заболевания маститом;
- способствует заживлению мелких ран, трещин на коже вымени и сосков;
- снижает риск травмирования соска во время дойки;
- не оказывает раздражающего воздействия.

Для достижения наилучшего эффекта рекомендуем использовать средство для обработки вымени после доения **Ultramil марок Green** (на основе молочной кислоты), **Blue** (на основе хлоргексидин биглюконата) или **JOD** (на основе полимерного комплекса йода).