

Общество с ограниченной ответственностью «СмартХим»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «СмартХим»

А.В. Мазура

«10» июня 2016 г.



Инструкция по применению **Средство моющее «Ultramil» марки JOD**

Назначение.

Средство моющее «Ultramil» марки JOD – специальное плёнкообразующее средство на основе высокомолекулярного соединения йода и PVP, функциональных и увлажняющих добавок, предназначенное для ухода за сосками вымени коров после каждой процедуры доения с целью профилактики мастита, сухости кожных покровов и появления трещин, защиты вымени от заражения и загрязнения. Средство готово к применению.

По органолептическим и физико-химическим показателям средство должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика и норма
1 Внешний вид, цвет	Однородная однофазная жидкость цвета применяемых красителей
2 Запах	Применяемых компонентов
3 Плотность, г/см ³	1,050±0,050
4 Показатель концентрации водородных ионов раствора с массовой долей средства 1%, ед. рН	7,0 ± 1,5
Примечания: 1 Допускается в процессе хранения появление небольшого осадка. 2 Образование осадка или помутнение при хранении не является браковочным фактором.	

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев в невскрытой упаковке производителя.

Условия хранения:

транспортировка и хранение согласно ГОСТ 27429 и ГОСТ 28303.

Хранить в крытых вентилируемых помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия солнечных лучей и отопительных приборов, в упаковке изготовителя при температуре не ниже 0⁰С и не выше 25⁰С. Не допускать замерзания средства.

Меры предосторожности:

Беречь от детей. При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности. Для защиты кожи рук могут применяться резиновые перчатки.

При попадании средства в глаза их необходимо промыть большим количеством воды. При попадании средства внутрь через пищевой тракт дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды. Рвоту не вызывать! Принять 10-20 измельченных таблеток активированного угля. При раздражении органов дыхания (першение в горле, кашель, затрудненное дыхание),

рези в глазах пострадавшего удаляют из помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой, дают теплое питье. При необходимости следует обратиться к врачу.

Способы применения:

Готовое к применению средство наносить сразу после доения. Всегда использовать чистую ёмкость для окунания сосков. Наполнить ёмкость до 3/4 объема, окунуть каждый сосок. НЕ ВЫТИРАТЬ. Защитная плёнка с соска удаляется непосредственно перед следующим доением с помощью воды либо моющего раствора средства «Ultramil» и салфетки.

Преимущества:

Предназначено для регулярной защиты от мастита и обеспечения идеального состояния сосков. Оказывает дезинфицирующее воздействие за счет содержания йода в составе комплекса. Отлично увлажняет кожу соска, не раздражает кожу вымени, надёжно защищает вымя от заражения и загрязнения, формирует видимую до следующего доения защитную плёнку на пути природных бактерий, присутствующих в твердой и жидкой грязи. Не стекает с поверхности кожи. Длительное антисептическое действие.

Для достижения наилучшего эффекта рекомендуем использовать средство для обработки вымени перед доением «Ultramil» марок **Pre** (на основе молочной кислоты), **Foam** или **Before** (на основе хлоргексидина биглюконата).